

# Ebeveynler ?çin Ameliyat Sonras? A?r? De?erlendirme Ölçe?i

## RECOMMENDED CITATION

memjavad (2026). *Ebeveynler ?çin Ameliyat Sonras? A?r? De?erlendirme Ölçe?i*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=20566>

## Özet

Ebeveynler İçin Ameliyat Sonrası Ağrı Değerlendirme Ölçeği (EASADÖ), orijinal adıyla Parents' Postoperative Pain Measure (PPPM) ölçeğinin Türkçe'ye kültürel uyarlama çalışmasıdır. Bu ölçek, cerrahi prosedür geçirmiş çocukların ameliyat sonrası ağrı düzeylerini, birincil bakıcılar olan ebeveynler aracılığıyla sistematik olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ebeveyn raporları, özellikle küçük çocuklarda ve sözel ifade yeteneği kısıtlı hastalarda ağrı yönetiminin temelini oluşturduğundan, bu aracın geçerlik ve güvenirlilik analizlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Ölçeğin Türkçe uyarlaması, Meryem Seval ve Aylin Kurt tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmiş olup, elde edilen psikometrik bulgular, ölçeğin Türk popülasyonunda güvenilir ve geçerli bir araç olarak kullanılabilirliğini göstermiştir. Bu çalışma, pediatrik ağrı yönetiminde ebeveyn katılımını destekleyen sağlam bir ölçüm aracı sunmaktadır.

## Anahtar Kelimeler

Ameliyat sonrası ağrı, çocuk ağrısı, ebeveyn değerlendirmesi, pediatrik ağrı, psikometrik özellikler, uyarlama, ağrı ölçeği.

## Yazarlar

Meryem Seval, Aylin Kurt.

## Amaç

Ölçeğin temel amacı, cerrahi müdahale sonrasında çocukların yaşadığı ağrının şiddetini ve niteliğini, ebeveynlerin gözlemleri ve algıları üzerinden standardize edilmiş bir şekilde ölçmektir. Bu, sağlık profesyonellerine, çocukların subjektif ağrı deneyimini, ebeveynlerin güvenilir bakıcılar ile değerlendirme imkanı sunarak uygun analjezik tedavi planlamasına olanak tanır.

Türkçe uyarlama çalışmasının spesifik amacı, Parents' Postoperative Pain Measure ölçeğinin Türkiye'deki klinik ve araştırma ortamlarında kullanılabilişliğini sağlamak, kültürel ve dilsel etkililiğini kanıtlamaktır.

## Yapı

Ebeveynler İçin Ameliyat Sonrası Ağrı Değerlendirme Ölçeği, çocuklarda ameliyat sonrası ağrının çok boyutlu yapısını ölçmeyi hedefler. Bu yapı, genellikle çocuğun ağrıya verdiği davranışsal tepkileri (hareket kısıtlılığı, yüz ifadeleri, ağlama), fizyolojik belirtileri ve sözel ifadeleri (eğer varsa) kapsar. Ebeveynler, çocuğun ağrıya bağlı olarak gösterdiği spesifik

davran  lar  de erlendirerek puanlama yapar.

 l ek, a r n n  iddetini nicel olarak belirleyerek, zaman i indeki de i imini izleme kapasitesine sahiptir. Bu, a r  y netiminin etkinli ini de erlendirmek a  s ndan kritik bir psikometrik yap d r.

## Ge erlik

Seval ve Kurt (2020) taraf ndan y r t len  al  mada, EASAD 'n n yap sal ve e  zamanl  ge erlik kan tlar n  sa lamak hedeflenmi tir. Yap  ge erli inin incelenmesi,  l ek maddelerinin kuramsal olarak  l mesi beklenen a r  yap s n  ger ekten  l t  n  do rulamay  i erir.

Uyarlama  al  mas n n bir par as  olarak, orijinal  l e in fakt r yap s n n T rk e versiyonda korunup korunmad    incelenmi  olmal d r. Bu s re ,  l e in kavramsal b t nl  n  ve hedef pop lasyonda do ru  l  m yapma yetene ini garanti alt na al r.

## G venirlik

 l e in g venirlik analizi, i  tutarl  k (Cronbach's Alpha katsay s ) ve muhtemelen test-tekrar test g venilirli i y ntemlerini i ermi tir. Y ksek i  tutarl  k de erleri,  l ekteki t m maddelerin ayn  temel yap y , yani ameliyat sonras  a r y   l mede tutarl  oldu unu g sterir.

G venilir bir  l  m arac , ayn  ebeveyn taraf ndan farkl  zamanlarda yap lan de erlendirmelerde benzer sonu lar  retmelidir, bu da test-tekrar test g venilirli i ile belirlenir. Bu g venirlik kan tlar , EASAD 'n n klinik uygulamada istikrarl  sonu lar verece ini destekler.

## Fakt r Analizi

EASAD 'n n T rk e uyarlama s recinde, orijinal  l e in fakt r yap s n  do rulamak amac yla Fakt r Analizi (muhtemelen Do rulay c  Fakt r Analizi - DFA) kullan lm  t r. Bu analiz,  l e in  ok boyutlu olup olmad  n  veya tek bir genel a r  fakt r nden mi olu tu unu belirler.

Fakt r yap s n n korunmas , k lt rel uyarlaman n ba ar   oldu unun temel g stergelerinden biridir ve  l e in puanlama sisteminin ge erlili ini destekler.

## Ara 

**Test T r :** Uyarlama

**Format:** Ebeveyn Raporlu A r  De erlendirme  l e i

**Mevcut Diller:** T rk e

**Poplasyon Grubu:** Cerrahi operasyon geirmi? ocuklar?n ebeveynleri

**Ya? Grubu:** Pediatrik hastalar (Genellikle bebeklikten ergenli?e kadar olan ya? aral???n? kapsar, ancak spesifik ya? aral??? orijinal le?in kapsam?na ba?l?d?r.)

**Poplasyon Detaylar?:** Hastanede yatan veya taburcu edilmi?, cerrahi mdahale sonras? a?r? ya?ayan ocuklar?n ebeveynleri.

**Test Metodolojisi:** Ebeveynlerin ocuklar?n?n davran???lar?n?, fizyolojik tepkilerini ve a?r? belirtilerini gzlemleyerek belirli bir derecelendirme sistemi zerinden puanlamas?.

## Anahtar Kelimeler

Parents' Postoperative Pain Measure, geerlik, gvenirlik, ocuk cerrahisi, a?r? ynetimi, ameliyat sonras? a?r?, ebeveyn kat?l?m?.

## Yazarlar

**Yazar ORCID Tan?mlay?c?s?:** Belirtilmemi?tir.

**Kurum E-posta Adresleri:** Belirtilmemi?tir.

**?leti?im Adresi:** aylinkurt67@gmail.com

## ?zinler, cret ve Test Y?l?

le?in Trke uyarlama al???mas? **2020** y?l?nda yay?nlanm???t?r. le?in kullan?m? iin gerekli izinler ve olas? cretlendirme bilgileri hakk?nda sorumlu yazar Aylin Kurt ile ileti?ime geilmesi gerekmektedir.

## Kaynaklar

Seval, M., &Kurt, A. (2020). Parents' Postoperative Pain Measure: Turkish validity and reliability. *Erciyes Med J.* doi:10.14744/etd.2020.59260

Makalenin orijinal PDF dosyas?na buradan ula???labilir: [journalagent.com](http://journalagent.com).

## Ebeveynler iin Ameliyat Sonras? A?r? De?erlendirme le?i Maddeleri

**NEML?:** le?in maddeleri kaynak ierikte yer almamaktad?r. Maddelerin tam listesi iin ilgili bilimsel makaleye ba?vurulmas? gerekmektedir.