

Pelvik Taban Distres Envanteri

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *Pelvik Taban Distres Envanteri*. Turkish Psychological Scales. Retrieved from <https://tr-scales.arabpsychology.com/?p=29029>

Özet

Pelvik Taban Distres Envanteri (PFDI-20), Türk popülasyonu için kültürel olarak uyarlanm?? ve geçerli?i kan?atlanm?? bir kendini bildirim anketidir. Bu ölçek, pelvik taban disfonksiyonu ile ili?kili semptomlar?n ?iddetini ve bu semptomlar?n bireylerin ya?am kalitesi üzerindeki etkisini de?erlendirmek amac?yla tasarlanm??t?r. Kaplan, Sut ve Sut (2012) taraf?ndan yap?lan kapsaml? bir çal??mada, PFDI-20 ve Pelvik Taban Etki Anketi (PFIQ-7) ölçeklerinin Türk popülasyonundaki psikometrik özellikleri titizlikle de?erlendirilmi?tir. Bu uyarlama, Türkçenin dilsel ve kültürel özelliklerine uygunlu?u sa?lanarak, pelvik taban sa?l??n?n çe?itli alanlar?ndaki distresi kapsaml? bir ?ekilde ölçmeyi hedefler.

Anahtar Kelimeler

Pelvik Taban Distresi, PFDI-20, PFIQ-7, Ya?am Kalitesi, Uyarlama, Türkçe, Jinekoloji, Ürojinekoloji.

Yazarlar

Petek Balkan? Kaplan, N. Sut, H. K. Sut

Amaç

Pelvik Taban Distres Envanteri'nin (PFDI-20) temel amac?, pelvik taban disfonksiyonu ile ili?kili semptomlar?n ?iddetini ve bu semptomlar?n bireylerin ya?am kalitesi üzerindeki etkisini Türk popülasyonunda güvenilir ve geçerli bir ?ekilde de?erlendirmektir. Ölçek, özellikle üriner, kolorektal-anal ve pelvik organ prolapsusu ile ilgili distresleri nicel olarak ölçerek klinik de?erlendirmelere ve tedavi sonuçlar?n?n izlenmesine yard?mc? olma? hedefler.

Bu envanter, klinisyenlere ve ara?t?rmac?lara, pelvik taban disfonksiyonu olan hastalar?n subjektif deneyimlerini daha iyi anlamalar? için standartla?t?r?lm?? bir araç sunar. Böylece, tedavi planlar?n?n ki?iselle?tirilmesine ve uygulanan müdahalelerin etkinli?inin objektif olarak de?erlendirilmesine katkıda bulunur.

Yap?

Pelvik Taban Distres Envanteri (PFDI-20), pelvik taban disfonksiyonunun çe?itli yönlerini kapsayan çok boyutlu bir yap?y? ölçek. Orijinal ölçek genellikle üç ana alt ölçekten olu?ur: Üriner Distres Envanteri (UDI-6), Pelvik Organ Prolapsus Distres Envanteri (POPDI-6) ve Kolorektal-Anal Distres Envanteri (CRADI-8). Bu alt ölçekler, s?ras?yla idrar kaç?ırma, pelvik organ sarkmas? ve kolorektal-anal semptomlar?n neden oldu?u s?k?nt?y? de?erlendirir.

Bu yap?sal ayr?m, ölçe?in bireylerin ya?ad??? spesifik distres alanlar?na ili?kin detayl? bilgi sa?lamas?na olanak tan?r ve ya?am kalitesi üzerindeki farkl? semptomlar?n etkilerini ayr? ayr? incelemeyi mümkün k?lar. Böylece, hastalar?n semptom profillerine göre daha hedefe yönelik tedavi stratejileri geli?tirilebilir.

Geçerlik

Kaplan, Sut ve Sut (2012) taraf?ndan yürütölen uyarlama ve geçerlik çal??mas?nda, Pelvik Taban Distres Envanteri (PFDI-20) ile Pelvik Taban Etki Anketi (PFIQ-7) aras?nda Spearman s?ra korelasyon matrixi sonuçlar?na göre önemli ölçüde korelasyon oldu?u bulunmu?tur. Bu bulgu, ölçeklerin benzer yap?lar? ölçtü?ünü ve **yak?nsak geçerli?e** sahip oldu?unu dü?ündürmektedir.

Ayr?ca, Spearman s?ra korelasyon analizi, anket sorular? ile objektif vajinal bulgular aras?nda anlaml? bir ili?ki oldu?unu göstermi?tir. Bu durum, ölçe?in klinik gerçekli?i yans?tma yetene?i olan **ölçüt geçerli?ini** desteklemektedir. Genel olarak, bulgular Pelvik Taban Distres Envanteri'nin Türk popölasyonunda pelvik taban disfonksiyonunu de?erlendirmek için geçerli bir araç oldu?unu göstermektedir.

Güvenirlik

Pelvik Taban Distres Envanteri'nin (PFDI-20) Türk popölasyonundaki iç tutarl?i???, Kaplan, Sut ve Sut (2012) çal??mas?nda yüksek olarak rapor edilmi?tir. Ölçe?in Cronbach Alfa güvenilirlik katsay?s? 0.908 olarak bulunmu?tur.

Bu de?er, psikometrik aç?dan mükemmel kabul edilen bir düzeyde olup, ölçek maddelerinin ayn? yap?y? tutarl? bir ?ekilde ölçtü?ünü ve güvenilir sonuçlar verdi?ini göstermektedir. Yüksek iç tutarl?i?k, ölçe?in farkl? zamanlarda ve farkl? ko?ullarda uyguland???nda benzer sonuçlar üretme kapasitesini art?r?r, bu da klinik ve ara?tırma ortamlar?nda kullan?m?n?n sa?laml???n? destekler.

Faktör Analizi

Sa?lanan kaynak içeri?inde Pelvik Taban Distres Envanteri'nin (PFDI-20) Türk adaptasyonu için spesifik bir **faktör analizi** detay?na yer verilmemi?tir. Ancak, orijinal PFDI-20 ölçe?i genellikle Üriner Distres Envanteri (UDI-6), Pelvik Organ Prolapsus Distres Envanteri (POPDI-6) ve Kolorektal-Anal Distres Envanteri (CRADI-8) olmak üzere üç ana alt ölçekten olu?an bir faktör yap?s?na sahiptir.

Türk popölasyonundaki adaptasyonun da bu orijinal faktör yap?s?n? koruyup korumad??? veya farkl? bir faktör yap?s? sergileyip sergilemedi?i hakk?nda daha fazla bilgi için detayl? psikometrik çal??malara ba?vurulmas? gerekmektedir. Adaptasyon sürecinde, faktör yap?s?n?n orijinal

ölçekle tutarlılığına incelenmesi kültürel etkililik açısından kritik öneme sahiptir.

Enstrüman

Test Tipi: Uyarlama

Format: Kendini bildirim anketi

Mevcut Dil: Türkçe

Popülasyon Grubu: Pelvik taban disfonksiyonu olan kadınlar

Yaş Grubu: Sağlanan kaynakta belirtilmemiştir.

Popülasyon Detayları: Pelvik taban semptomları yaşayan ve bu durumun yaşam kaliteleri üzerindeki etkisini değerlendirmek isteyen bireyler.

Test Metodolojisi: Bireylerin pelvik taban semptomları ve bu semptomların günlük aktiviteler üzerindeki rahatsız edici etkileri hakkındaki sorulara yanıtlanacak bir anket formatı.

Anahtar Kelimeler

Pelvik Taban Distres Envanteri, PFDI-20, PFIQ-7, Kadın Sağlığı, Psikometrik Özellikler, Distres, Fonksiyonel Değerlendirme.

Yazarlar

Yazar ORCID Tanımlama: Mevcut değil

Kurum E-posta Adresleri: petekkaplan@hotmail.com

Yazışma Adresi: Mevcut değil

İzinler, Ücretler ve Test Yılı

Ölçeğin kullanımı için izinler ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi, sorumlu yazar Petek Balkanlı Kaplan ile iletişime geçilerek öğrenilebilir. Genellikle, adaptasyon ölçeklerinin kullanımı için orijinal ölçek geliştiricilerinden ve/veya adaptasyonu yapan yazarlardan izin alınması gerekmektedir. Ölçeğin Türk popülasyonundaki adaptasyon çalışması 2012 yılında yayınlanmıştır.

Referanslar

Kaplan, P. B., Sut, N., & Sut, H. K. (2012). Validation, cultural adaptation and responsiveness of two pelvic-floor-specific quality-of-life questionnaires, PFDI-20 and PFIQ-7, in a Turkish population. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 162(2), 229-233. doi:10.1016/j.ejogrb.2012.03.004

Orijinal PDF buradan indirilebilir: [the-pelvic-floor-distress-inventory-pfdi-20-toad.pdf](#)

Pelvik Taban Distres Envanteri Maddeleri

ÖNEMLİ: Aşağıdaki ölçek maddeleri orijinal dilinde korunmalı ve hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.

Sağlanan kaynak içeriğinde Pelvik Taban Distres Envanteri'nin maddeleri yer almamaktadır.